



**Mederilab**<sup>®</sup>

## **OTILAV**

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-006

Solución ótica ceruminolítico astringente  
Limpiador queratolítico

### **FÓRMULA:**

Cada ml contiene:

Ácido salicílico.....2 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

### **ESPECIES:**



### **INDICACIONES:**

Ayuda a remover residuos, suciedad y secreciones, manteniendo limpio y seco el canal aditivo.

Se puede utilizar como limpiador auricular de uso frecuente, para facilitar el examen del oído, o previo al tratamiento específico de la otitis externa.

### **MECANISMO DE ACCION:**

Destruye las células del estrato córneo al hidratarlas, hincharlas y ablandarlas, lo que acelera la descamación y solubilidad de la capa lipídica intercelular, liberando y separando entre sí las células del estrato córneo. Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas mediante la acidificación del medio.

### **FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:**

Tiene una adecuada absorción dérmica. La vida del metabolito parenteral es de 25 minutos, mientras su metabolismo activo es hasta de 30 horas. Tiene una unión a proteínas del 50 al 80%. La eliminación en dosis terapéuticas es de predominio hepático.

### **DOSIS:**

Aplicar 3 a 5 ml dentro del canal auditivo 2 o 3 veces al día, para remover cerumen y exudados, o antes de la aplicación del medicamento para el tratamiento específico de la otitis externa.

En animales predispuestos se recomienda 2 veces por semana.

Después de aplicar el producto, realice un suave masaje en la base de la oreja, después limpie el interior con una torunda humedecida con OTILAV sin frotar. Puede repetir el procedimiento si es necesario.

### **VIA DE ADMINISTRACIÓN:**

Ótica.

### **TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:**

Los salicilatos son posiblemente teratogénico y deben de evitarse su uso durante la preñez particularmente durante los últimos estadios.

El ácido salicílico debe usarse con precaución en gatos, debido a su inhabilidad para excretar y metabolizar rápidamente los salicilatos.

### **ADVERTENCIAS:**

Agítese bien el producto antes de usar.

Para aplicación ótica solamente.

Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre enjuague con abundante agua.

De restricción de uso en gestación.

El uso de OTILAV en gatos debe ser monitoreado debido a la sensibilidad a los salicilatos en esta especie.

No se deje al alcance de los niños.

Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

### **PRESENTACIONES:**

Frasco con 120 ml

### **USO VETERINARIO CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:  
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.  
Tel. (33) 10 28 36 76  
[www.mederilab.com](http://www.mederilab.com)