



Mederilab®

CLORHEXIN JABON

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-039

Jabón
Antiséptico

FÓRMULA:

Cada g contiene:

Gluconato de Clorhexidina..... 20 mg
Excipiente c.b.p.....1 g

ESPECIES:



INDICACIONES:

Jabón antiséptico auxiliar en el tratamiento de dermatitis e infecciones cutáneas causadas por bacterias (grampositivas y gramnegativas) como *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Clostridium* y hongos como: *Candida albicans*, *Dermatofitos* y *Malassezia pachidermatis*.

MECANISMO DE ACCION:

A concentraciones bajas su acción es bacteriostática y a concentraciones altas tiene un poder bactericida rápido. El proceso letal está relacionado con una serie de cambios citológicos y fisiológicos relacionados, algunos de los cuales son reversibles, y que culminan con la muerte de la célula.

La secuencia es la siguiente: Atracción rápida hacia la célula bacteriana. Adsorción específica e intensa a ciertos compuestos que contienen fosfato en la superficie bacteriana. Alteración de los mecanismos de la pared bacteriana. Atracción hacia la membrana citoplasmática. Dispersión de los componentes citoplasmáticos de bajo peso molecular e inhibición de enzimas unidas a la membrana citoplasmática como el adenosintrifosfato. Precipitación de componente del citoplasma por la formación de complejos con radicales fosfatados, como adenosintrifosfato y ácidos nucleicos.

No se inactiva en presencia de materia orgánica.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

Después de la aplicación tópica se ha demostrado que persiste durante una semana una reducción significativa en la flora total de la piel. Su absorción sistémica y oral es mínima. Posee una acción residual duradera, permaneciendo químicamente activa de 5-6 horas.

DOSIS:

Moje el pelaje del animal y enjabónelo, frote hasta formar abundante espuma, deje reposar durante 5 minutos.

Posteriormente enjuague con abundante agua y seque.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Hipersensibilidad y reacciones irritativas locales, úlceras corneales en caso de tener contacto con los ojos.

INTERACCIONES:

No usar en combinación ni después de la aplicación de ácidos, sales de metales pesados o yodo.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad al componente de la fórmula.

Para uso externo únicamente.

Evite el contacto con las mucosas y ojos, si esto ocurre enjuague con abundante agua.

Enjuague perfectamente hasta retirar todos los residuos del producto.

Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz solar.

No se deje al alcance de los niños.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

PRESENTACION:

Pastilla con 100 g

**USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com