



Mederilab[®]

OFTALDEX

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-038

Solución oftálmica
Corticoesteroide de acción antiinflamatoria

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Dexametasona 1 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

ESPECIES:



INDICACIONES:

Para el tratamiento de procesos inflamatorios y alérgicos de las estructuras oculares superficiales y sus anexos como: blefaroconjuntivitis alérgica, queratitis infiltrativa no ulcerativa, uveítis aguda y crónica. Así como en procesos quirúrgicos que provoquen inflamación ocular.

MECANISMO DE ACCION:

Los corticoides inhiben la fosfolipasa, alterando la vía metabólica del ácido araquidónico y disminuyendo la inflamación. Reducen la vasodilatación, la permeabilidad capilar, la infiltración leucocitaria y la liberación de mediadores inflamatorios por las células.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

La penetración de los corticoesteroides aplicados vía tópica es escasa. Penetra en la córnea eficazmente. Es transportada en el torrente sanguíneo, unida a proteínas plasmáticas. La biotransformación se realiza en el sistema microsomal hepático. Su excreción es del 75% vía renal y 25% a través de heces.

DOSIS:

Aplicar una gota en cada ojo cada 8 o 12 horas, durante 7 días a criterio del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oftálmica.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Está contraindicado en presencia de queratitis ulcerosa, ya que retrasa la cicatrización corneal al afectar negativamente a las actividades fibroblásticas y queratocítica.

Contraindicado en las infecciones víricas de la superficie ocular.

El tratamiento prolongado con corticoides tópicos puede inducir supresión de la glándula suprarrenal.

Puede elevar la presión intraocular.

INTERACCIONES:

Antagonismo: anfotericina B, anticonvulsivos, antihistamínicos, barbitúricos, bloqueadores α adrenérgicos, efedrina, hidrato de cloral, insulina, isoniacida.

Sinergia: indometina, estrógenos, ácido acetilsalicílico, asociación con vitamina D se antagoniza.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

No se aplique en caso de existir procesos ulcerativos de la córnea, infecciones víricas o micóticas, conjuntivitis purulenta aguda o blefaritis purulenta aguda.

El uso prolongado puede producir aumento de la presión intraocular.

No se deja al alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

PRESENTACION:

Frasco gotero con 10 ml

**USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com