



Mederilab[®]

CLORHEXIN SPRAY

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-033

Solución tópica
Antiséptico

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Gluconato de Clorhexidina..... 20 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

ESPECIES:



INDICACIONES:

Spray antiséptico de uso externo con acción bactericida de amplio espectro para el tratamiento de heridas en la piel.

MECANISMO DE ACCION:

A concentraciones bajas su acción es bacteriostática y a concentraciones altas tiene un poder bactericida rápido. El proceso letal está relacionado con una serie de cambios citológicos y fisiológicos relacionados, algunos de los cuales son reversibles, y que culminan con la muerte de la célula.

La secuencia es la siguiente: Atracción rápida hacia la célula bacteriana. Adsorción específica e intensa a ciertos compuestos que contienen fosfato en la superficie bacteriana. Alteración de los mecanismos de la pared bacteriana. Atracción hacia la membrana citoplasmática. Dispersión de los componentes citoplasmáticos de bajo peso molecular e inhibición de enzimas unidas a la membrana citoplasmática como el adenosintrifosfato. Precipitación de componente del citoplasma por la formación de complejos con radicales fosfatados, como adenosintrifosfato y ácidos nucleicos.

No se inactiva en presencia de materia orgánica.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

Después de la aplicación tópica se ha demostrado que persiste durante una semana una reducción significativa en la flora total de la piel. Su absorción sistémica y oral es mínima. Posee una acción residual duradera, permaneciendo químicamente activa de 5-6 horas.

DOSIS:

Limpie el área afectada y atomice directamente sobre la herida, para que la solución tenga contacto con la piel, removiendo el exceso con una gasa estéril.

Aplique una vez al día, hasta que la lesión haya sanado a criterio del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Hipersensibilidad y reacciones irritativas locales, úlceras corneales.

INTERACCIONES:

No usar en combinación ni después de la aplicación de ácidos, sales de metales pesados o yodo.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad al componente de la fórmula.

Para uso externo únicamente.

Evite el contacto con las mucosas y ojos, si esto ocurre enjuague con abundante agua.

No se aplique a cachorros menores de 8 semanas de edad.

Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz solar.

No se deje al alcance de los niños.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

PRESENTACION:

Frasco con 60 ml

Frasco con 240 ml

USO VETERINARIO CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com