



Mederilab[®]

PREGABALYN-10

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-050

Tableta palatable
Analgésico/ Antiepiléptico

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Pregabalina 20 mg
Excipiente c.b.p..... 1 tableta

ESPECIE:



INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento del dolor neuropático (compresión medular, neuropatías, cistitis intersticial) tratamiento de la alodinia y de la epilepsia refractaria.

MECANISMO DE ACCION:

Su mecanismo de acción esta mediado por la unión a las subunidades alfa-2-delta de tipo P/Q de los voltajes de los canales de calcio, de este modo puede atenuar selectivamente la entrada de calcio al espacio presináptico a través de estos canales y la disminución de a liberación de neurotransmisores excitatorios tales como el glutamato, noradrenalina, serotonina, dopamina y sustancia P. No interactúa con los receptores GABA.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

Se absorbe rápidamente después de la administración oral. La administración conjunta de alimentos reduce la velocidad pero no el grado de absorción de la pregabalina. Tiene baja unión a las proteínas plasmáticas y se distribuye bien en todos los tejidos, incluyendo el cerebro. Tiene un volumen de distribución de 0.6 L/kg. El 80% de la dosis es excretada sin cambios en la orina.

DOSIS:

1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 8 o 12 horas.

Incrementar gradualmente la dosis en caso necesario hasta 4 mg por Kg. de peso cada 8 o 12 horas.

La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Su principal efecto adverso es la sedación, somnolencia y ataxia.

El ajuste de la dosis minimiza los efectos adversos después del inicio del tratamiento o aumento de la dosis.

INTERACCIONES:

Disminuye su concentración después de la coadministración con inductores enzimáticos AEM, tale como carbamazepina y fenitoína Potencializa los efectos sobre SNC de lorazepam y etanol.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la formula.

Evitar su uso en animales gestantes, en lactación y con problemas renales.

Mantengase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

PRESENTACION:

Caja con 30 tabletas.

USO VETERINARIO

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com