



Mederilab®

COCCIMED SUSPENSION

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-085

Suspensión oral
Antiparasitario

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Toltrazuril 50 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml

ESPECIES:



INDICACIONES:

Para el tratamiento de parasitosis internas ocasionadas por *Eimeria Bovis*, *Eimeria zuernii*, *Eimeria crandallis*, *Eimeria ovinoidalis*, *Hepatozoon canis*, *Isospora suis*, *Toxoplasma spp*, *Sarcocystis spp*, *Theileria spp*, *Cytospora spp*, *Neospora caninum*, *Isospora spp*, *Cystoisospora felis* y *Hammondia heydorni*,

MECANISMO DE ACCION:

Toltrazuril: Inhibe la división nuclear de esquizontes y microgametos. Actúa sobre el desarrollo a nivel intracelular en las fases asexual y sexual del coccidio y de la isospora.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

Toltrazuril: Después de la administración oral, se absorbe lentamente en el intestino delgado y es distribuido por el plasma a los diferentes tejidos. Las concentraciones más altas se encuentran en el hígado; se metaboliza con rapidez al derivado ponazuril y es excretado de manera lenta por las heces.

DOSIS:

Bovinos: 30 ml por cada 100 Kg. de peso.
Porcinos, ovinos, caprinos y caninos: 4 ml por cada 10 kg de peso.
Felinos: 1 ml por cada 5 Kg de peso.

La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos que se pueden presentar son alteraciones gastrointestinales.

INTERACCIONES:

No se han reportado interacciones.

ADVERTENCIAS:

No administrar en pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Evitar su uso durante la gestación o lactación.

Agitar antes de usarse.

Tiempo de retiro:

Bovinos productores de carne: No sacrificar animales tratados hasta 63 días después de la última administración.

Ovinos y caprinos: No sacrificar animales tratados hasta 42 días después de la última administración.

Porcinos: No sacrificar animales tratados hasta 70 días después de la última administración.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Producto exclusivo en Medicina Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco con 20 ml

Frasco con 60 ml

Frasco con 250 ml

**USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario.

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com