



Mederilab®

## OFTALUB

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-081

Solución oftálmica  
Lubricante ocular

### FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Alcohol polivinílico ..... 14 mg

Sulfato de condroitina ..... 100 mg

Vehículo c.b.p..... 1 ml

### ESPECIES:



### INDICACIONES:

Indicado en el tratamiento de insuficiencia lagrimal y queratitis seca.

Coadyuvante en la disminución o prevención de edema. Mejora la cicatrización. Forma una película protectora que protege a la córnea

y a la conjuntiva de la irritación mecánica.

### MECANISMO DE ACCION:

**Alcohol polivinílico:** Es una resina sintética sustituta de la lágrima. Posee una baja viscosidad aunque una buena adsorción al epitelio dada su baja tensión superficial dándole un buen tiempo de permanencia, confiriéndole en general propiedades estabilizadoras de la película lagrimal.

**Condroitín sulfato:** Los glucosaminoglicanos polisulfatados inhiben una serie de enzimas (lisozima, hialuronidasa y plasmina), disminuyen la síntesis de prostaglandinas E2, reducen la producción de radicales superóxido tóxicos y aumentan la síntesis de proteoglicanos, colágeno y ácido hialurónico del colágeno. Su efecto sobre la cicatrización de las úlceras podría deberse a la inhibición de la proteasa lagrimal.

### FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

**Alcohol polivinílico:** Las lágrimas artificiales son productos administración por vía tópica sobre el epitelio córneo-conjuntival con la finalidad de aumentar la humedad de la superficie ocular además de lubricar el movimiento del parpadeo y manteniendo la integridad de la superficie ocular.

**Condroitín sulfato:** Cuenta con acción lubricante, antiinflamatorio natural e inhibe la fijación del complemento.

### DOSIS:

Administrar 1 a 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oftálmica.

### TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

**Alcohol polivinílico:** Dolor, ardor o sensación punzante y enrojecimiento.

**Sulfato de condroitina:** Puede observarse inflamación.

### INTERACCIONES:

Cuando se usa por vía oftálmica no se ha registrado interacciones.

### ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

### PRESENTACION:

Frasco gotero con 10 ml

**USO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:  
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.  
Tel. (33) 10 28 36 76  
www.mederilab.com